КАРТА НА ПАЦИЕНТА

Абоксома (апиксабан)
Aboxoma (apixaban)

Карта на пациента

Носете тази карта винаги със себе си/Тази карта винаги трябва да е с детето или с полагащото грижи лице

Покажете тази карта на фармацевта, денталния лекар и други медицински специалисти преди лечение.

Аз съм на антикоагулантно лечение с Абоксома (апиксабан) за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци.

Моля, попълнете този раздел или помолете лекаря да направи това.
Име:
Дата на раждане:
Показание:
Тегло (за педиатрична популация):
Доза: mg два пъти дневно
Име на лекаря:
Телефон на лекаря:

Информация за пациентите/полагащите грижи лица

- Приемайте/давайте Абоксома редовно според указанията. Ако се пропусне сутрешната доза, приемете/дайте я веднага, щом се сетите, а също така може да я приемете/дадете заедно с вечерната доза. Пропуснатата вечерна доза може да се приеме/даде само същата вечер. Не приемайте/не давайте две дози следващата сутрин, а вместо това продължете със схемата на прилагане два пъти дневно на следващата сутрин, както се препоръчва.
- Не спирайте да приемате/давате Абоксома без да се консултирате с лекаря,тъй като пациентът е изложен на риск от инсулт (възрастни)/кръвен съсирек (педиатрични пациенти) или други усложнения.
- Абоксома спомага за разреждане на кръвта. Това обаче може да увеличи риска от кървене.
- Признаците и симптомите на кървене включват поява на синини или подкожни кръвоизливи, катранени изпражнения, кръв в урината, кървене от носа, замаяност, умора, бледост или слабост, внезапно тежко главоболие, изкашляне на кръв или повръщане на кръв.
- В случай на кървене, което не спира от само себе си, **потърсете медицинска помощ незабавно**.
- Ако Вие/пациентът се нуждаете (нуждае) от операция или инвазивна процедура, уведомете Вашия лекуващия лекар, че приемате Абоксома/уведомете лекуващия лекар, че детето приема Абоксома.

{04/2025}

Информация за медицинските специалисти

- Абоксома (апиксабан) е перорален антикоагулант, действащ чрез директно селективно инхибиране на фактор Ха.
- Абоксома може да увеличи риска от кървене. В случай на масивно кървене, Абоксома трябва да бъде спряна незабавно.
- Лечението с Абоксома не изисква рутинно проследяване на експозицията. Калибриран метод за количествено определяне на анти-фактор Ха може да бъде полезен при

извънредни ситуации, напр. при предозиране и спешна хирургична интервенция (коагулационните тестове, като протромбиново време (PT), международно нормализирано съотношение (INR) и активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), не се препоръчват) – вижте КХП.

- За възрастни е налично неутрализиращо средство на анти-фактор Ха активността на апиксабан, но неговата безопасност и ефикасност не са установени при педиатрични пациенти (вижте кратката характеристика на продукта, съдържащ андексанет алфа).